

# EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DES NAUSEES ET VOMISSEMENTS CHIMIO-INDUITS (NVCI) ET DE LEUR IMPACT SUR LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS



E. Rose<sup>1</sup>, P. Savary<sup>1</sup>, O. Rigal<sup>2</sup>, F. Basuyau<sup>1</sup>, R. Varin<sup>3</sup>, M. Daouphars<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pharmacie <sup>2</sup>Oncologie, Centre Henri Becquerel, Rue d'Amiens 76000 Rouen <sup>3</sup>Pharmacie CHU Charles Nicolle, rue de Germont 76000 Rouen

## Objectifs

- Analyser les modalités de prise en charge des NVCI par rapport aux recommandations internationales
- Evaluer le ressenti des patients à domicile

## Matériel et méthodes

- Etude prospective de 5 mois conduite dans un centre de lutte contre le cancer (122 lits d'hospitalisation, 36 lits hôpital de jour)
- Patients d'hématologie et oncologie recevant une première cure de chimiothérapie (chimiothérapie initiale ou lignes de traitement suivantes)
- Protocoles de chimiothérapie classés en fonction de leur pouvoir émétisant d'après la littérature


### A partir des recommandations :

- Analyse des prescriptions antiémétiques selon l'AFSOS, l'ASCO, la MASCC et la NCNN
- Evaluation des connaissances des médecins par questionnaire


A l'aide du questionnaire FLIE (Functional Living Index-Emesis) : évaluation de la qualité de vie des patients

## Résultats


Nombre de patients	172
Age moyen	54 ans
Sexe ratio M/F	0,25



Risque émétisant




Connaissance des médecins sur la prise en charge antiémétique



Les médecins connaissent mieux la prise en charge antiémétique en aigu qu'en chronique


Prescriptions d'antiémétiques conformes aux recommandations




La moitié des prescriptions d'antiémétiques en aigu ou chronique sont conformes aux recommandations. Seuls 40% des patients reçoivent les traitements appropriés à la fois pour les NVCI aigus et chroniques

Survenue des NVCI

■ Nausées ■ Vomissements ■ N et V



Qualité de vie des patients ayant des NVCI



Parmi les patients ayant des NVCI, plus des 2/3 ont ressenti un impact sur leur qualité de vie

Adhérence aux recommandations en fonction du pouvoir émétisant



Plus le risque émétique est fort, meilleure est l'adhérence aux recommandations

## Discussion/Conclusion

Les NVCI représentent toujours un effet indésirable majeur des chimiothérapies ayant un impact non négligeable sur la qualité de vie des patients. Cette étude montre que leur prise en charge n'est pas optimale. Il est donc nécessaire d'effectuer une nouvelle diffusion des recommandations ainsi qu'une nouvelle formation des médecins pour leur utilisation.