

E. Troccaz, A. Delhoume, C. Recoules, C. Rey, D. Charley, L. Foroni, B. Allenet
Pôle pharmacie - CHU de Grenoble - BP 217 - 38043 GRENOBLE Cedex 09



Introduction

Les patients traités en **hôpital de jour d'oncologie** sont de plus en plus nombreux à avoir recours **aux médecines alternatives et complémentaires (MAC)**. Ainsi, tout en **respectant le patient dans ses choix**, le pharmacien clinicien doit s'impliquer dans le **recensement** et **l'évaluation** de ces pratiques. L'entretien pharmaceutique vise à évaluer **l'innocuité et l'efficacité** de ces traitements, identifier et gérer d'éventuelles **interactions médicamenteuses** avec la chimiothérapie et le traitement chronique.

Patients et Méthodes

- ✓ **Etude rétrospective** sur des données recueillies au cours des **entretiens pharmaceutiques** avec les patients ayant recours à des MAC (**n=100**), réalisés de **novembre 2010 à juillet 2011** :
 - Type de MAC: homéopathie, phytothérapie, oligothérapie, aromathérapie, compléments alimentaires, autres.
 - Type d'effet indésirable chimio-induit pris en charge (digestif, hépatique, rhumatologique, psychologique, immunitaire...)
- ✓ **Elaboration d'une grille** permettant de coter la **typologie des éléments suivants** :
 - Avis pharmaceutique communiqué au patient: favorable, défavorable, favorable sous réserves, sans avis pharmaceutique.
 - Argumentaire des avis défavorables: efficacité non démontrée ou origine inconnue des produits, effets indésirables, interactions MAC/traitement chronique ou chimiothérapie ou traitement de support.
 - Conseil pharmaceutique: optimisation du plan de prise et/ou modalités d'administration inadaptés...
 - Comportement du patient suite à l'intervention du pharmacien: initiation ou poursuite du traitement, arrêt du traitement ou non instauration, attente des résultats de la recherche bibliographique.


Résultats



Description des indications des trois principales médecines alternatives et complémentaires utilisées par les patients


Type d'effet indésirable chimio-induit pris en charge ou autre	Homéopathie (n=157)	Phytothérapie (n=99)	Compléments alimentaires (n=61)
Digestif	36%	20%	2%
Dermatologique	0%	2%	7%
Hématologique	0%	1%	2%
Hépatiques	3%	31%	7%
Métabolique	1%	3%	0%
Neurologique	3%	0%	0%
Ophthalmique	0%	2%	0%
Rhumatologique	1%	0%	0%
Stomatologique	4%	2%	10%
Stress/Anxiété	13%	1%	0%
Alopécie	0%	0%	0%
Cardiaque	4%	0%	0%
Immunitaire	6%	22%	67%
Insomnie	0%	3%	0%
Fatigue	13%	1%	0%
Traitement chronique	3%	2%	2%
Données manquantes	15%	9%	5%

Causes des avis défavorables (n=16)



- **Effet indésirable**: Le pharmacien a déconseillé le produit en raison du risque d'effet indésirable. - **Interaction**: Situation dans laquelle une interaction MAC/chimiothérapie ou MAC/traitements de support ou MAC/traitements chroniques, est probable ou démontrée.

Avis favorable avec réserve: types de réserves émises (n=48)



Comportement des patients après avis pharmaceutique défavorable (n=16)

Arrêt	43,5%
Non instauration	19%
Poursuite	6%
<i>(Données manquantes 31,5%)</i>	
Comportement des patients après avis pharmaceutique réservé (n=48)	
Instauration ou poursuite du traitement	75%
Attente des résultats bibliographiques	8%
Abstention	2%
<i>(Données manquantes 15%)</i>	

Discussion-Conclusion

- ✓ Les patients cancéreux ont largement recours aux MAC durant leur traitement de chimiothérapie: 34% des patients avec lesquels le pharmacien s'est entretenu au cours de l'étude, utilisent ces médecines.
- ✓ L'avis du pharmacien clinicien, interlocuteur privilégié, est globalement bien accepté.
 - A lui de **s'investir** dans ce domaine pour **garantir** au patient une **information claire et objective** ainsi qu'une prise en charge thérapeutique globale optimisée et sécurisée.