Prix de bourse SFPO/ Académie de pharmacie

IDENTIFICATION D'ADAM 9 EN TANT QUE MEDIATEUR
DE LA DISSEMINATION METASTATIQUE INDUITE PAR LE
STRESS OXYDANT ET EVALUATION DE MODULATEURS
PHARMACOLOGIQUES DE CE PROCESSUS

Céline MONGARET

Laboratoire d'accueil : EA 1833

Ecole doctorale GC2ID

Responsables de stage : Dr F. LEMARE, Dr J. ALEXANDRE

Directeur du laboratoire d'accueil: Dr B. WEILL

LE STRESS OXYDANT

Formes Réactives de l'Oxygène (FRO) et cancer :

- ✓ Concentration augmentée dans les tissus cancéreux
- ✓ Implication dans l'oncogenèse :
 - Prolifération, survie des cellules cancéreuses
 - Invasion des cellules cancéreuses

LES PROTEINES ADAM (A disintegrin And Metalloprotease)

- Activation d'ADAM par clivage du **pro domaine**

- **Domaine métalloprotéasique :**

- clivage de plusieurs ligands tels que l'HB EGF, le TNF => signaux de prolifération

- dégradation de l'ECM

- clivage de la région membranaire de certaines cytokines, chemokines et leurs récepteurs

- **Région riche en cystéine** et son domaine **disintégrine** => Adhérence cellule/cellule, cellule/ ECM

Figure 1 : Récapitulatif de l'implication des protéines ADAM dans la biologie de la cellule cancéreuse³

Surexpression d'ADAM9 dans de nombreux cancers (sein, rein, prostate, colon...)

RESULTATS OBTENUS

- Expression d'ADAM9 et activité ADAM spécifique sur les cellules d'adénocarcinome pulmonaire exposées au H_2O_2

Expression d'ADAM 9 transmembranaire et d'ADAM9 secrétée

➔ L'activité métalloprotéasique et l'expression des 2 isoformes d' **ADAM9** **augmentent** de façon concentration dépendante en présence d' **H_2O_2** .

RESULTATS OBTENUS

- Implication d'ADAM9 dans l'invasion et l'adhérence induite par H_2O_2

Les cellules n'exprimant plus la protéine ADAM9 ont une diminution d'adhérence et d'invasion induite par l' H_2O_2

Implication de la protéine SRC et de la PKC dans le mécanisme de régulation d'expression d'ADAM9

- Activité métalloprotéasique d'ADAM9 modulée par la PKC :
 - phosphorylation du domaine intracytoplasmique de la protéine ⁴
- Protéine SRC modulée par le stress oxydant :
 - FRO au niveau des cellules cancéreuses de colon activation de la protéine SRC.
 - Diminution de la prolifération et de l'angiogenèse des cellules cancéreuses par le le dasatinib, inhibiteur de la protéine SRC ⁵

4 : Izumi et al, A metalloprotease-disintegrin, MDC9/meltrin-gamma/ADAM9 and PKCdelta are involved in TPA-induced ectodomain shedding of membrane-anchored heparin-binding EGF-like growth factor, *EMBO J.*1998

5 : Kopetz S et al, Synergistic activity of the SRC family kinase inhibitor dasatinib and oxaliplatin in colon carcinoma cells is mediated by oxidative stress, *Cancer Res.* 2009

OBJECTIF DES TRAVAUX A VENIR

- Implication de la voie de signalisation SRC et PKC dans la modulation d'expression d'ADAM9 *in vitro* à l'aide d'inhibiteurs qui sont respectivement le dasatinib et la staurosporine
- Mise au point d'un modèle *in vivo* de métastases pulmonaires
Injection en intraveineux de cellules cancéreuses pulmonaires plus ou moins transfectées avec un ARN interférent stable ADAM 9
- Evaluation pharmacologique de traitements anti-ADAM9 sur le modèle de métastases *in vivo* selon 3 stratégies distinctes:
 - Le dasatinib : inhibiteur de la protéine SRC
 - La staurosporine : inhibiteur de la PKC
 - Blocage par un anticorps dirigé contre l'ectodomaine d'ADAM9

Merci de votre attention

Technique d'adhérence *in vitro*

Cellules A549

Cellules A549 +
1mM H_2O_2

Cellules A549
transfectées + 1mM H_2O_2

Technique d'invasion *in vitro*

Cellules A549

Cellules A549 +
1mM H₂O₂

Cellules A549
transfectées + 1mM H₂O₂

STRESS OXYDANT ET INVASION TUMORALE

Source de taux élevés en FRO dans l'environnement des cellules cancéreuses induisant un potentiel métastatique³.

Implication d'ADAM9 dans l'invasion induite par l'H2O2

Les cellules n'exprimant plus la protéine ADAM9 ont une diminution d'invasion induite par l'H2O2