

PLACE DES ANTIFONGIQUES DANS LE TRAITEMENT EMPIRIQUE DES INFECTIONS FONGIQUES CHEZ LE PATIENT NEUTROPENIQUE FEBRILE : ANALYSE DES PRESCRIPTIONS SUR 2013 ET 2014



A.Risal, E.Guiller, CE.Barthélemy, P.Tilleul, H.Junot
Service Pharmacie, Hôpital La Pitié Salpêtrière, 47, Bd de l'Hôpital, Paris



Introduction

Le traitement empirique des neutropénies fébriles fait partie des référentiels de bon usage des antifongiques hors GHS (Candidas®, Ambisome®, Vfend®, Noxafil®) basés sur les recommandations de juste prescription APHP et sur celles de l'IDSA (Infectious Diseases Society of America)*.


Objectif: Ces antifongiques étant en distribution nominative contrôlée, une analyse rétrospective de leur utilisation dans cette indication a été effectuée sur les prescriptions de 2013 et 2014

Matériel et méthodes

- × Suivi des prescriptions nominatives des 4 spécialités antifongiques en 2013 et 2014
- × Extraction des données concernant les patients neutropéniques ayant bénéficié d'un traitement empirique antifongique. (posologies, durées de traitement).

Résultats

En 2013 et 2014, 87 et 62 patients neutropéniques ont reçu un traitement empirique antifongique :



- Candidas® est majoritairement utilisé en **première intention**.
- 7 patients en 2013 et 7 en 2014 ont reçu Ambisome® après Candidas® (inefficacité ou intolérance). Seul 4 patients en 2013 et 7 en 2014 ont reçu Ambisome® en première intention.
=> **Ambisome®** est donc préférentiellement utilisé en **2nd intention**
- Peu de patients sont traités par Noxafil® et Vfend®
=> Ces médicaments sont prescrits en **prophylaxie secondaire** à la fin de l'épisode fébrile

La durée moyenne de traitement est très variable : 2013 : 12.12 jours [± 10.95], 2014 : 11.54 jours [± 8.94]

Les posologies sont conformes aux recommandations de l'IDSA. Elles sont par ailleurs systématiquement adaptées à la fonction rénale du patient pour Ambisome® et à la fonction hépatique pour Candidas®.

Conclusions

Les recommandations de l'IDSA et de la juste prescription APHP sont respectées en hématologie clinique pour le traitement des patients neutropéniques fébriles. Dans notre hôpital, Candidas® est préféré à l'Ambisome® en première intention. L'analyse et le suivi des dispensations des antifongiques couteux sont présentés chaque année en COMAI (Comité des Anti-Infectieux).

*IDSA Clinical practice guideline, <http://cid.oxfordjournals.org>