

PARCOURS DE SOINS ONCORAL : AMELIORATION DE L'OBSERVANCE ET DE LA SATISFACTION DES PATIENTS TRAITES PAR ANTICANCEREUX ORAUX

G. Descotes¹, AG. Caffin^{1,2}, F. Ranchon^{1,2,3}, D. Bernard^{1,2}, C. Neugnot¹, N. Vantard^{1,2}, V. Schwiertz^{1,2}, C. Alloux^{1,2}, MG. Guédât^{1,2}, N. Gauthier^{1,2}, E. Kiouris^{1,2}, S. Hé^{1,2}, C Gourc^{1,2}, L. Cornet^{1,2}, A. Nierenberger^{1,2}, C. Rioufol^{1,2,3}.

¹ONCORAL, Hospices Civils de Lyon (HCL), ²Unité de Pharmacie Clinique Oncologique (UPCO), Groupement Hôpitaux Sud, Hospices Civils de Lyon (HCL) ³EMR 3738, Université Lyon 1



Introduction

Le développement des anticancéreux oraux (ATCO) a entraîné la création de **nouveaux modes de prise en charge**. En concordance avec le 3^{ème} plan cancer, les Hospices Civils de Lyon se sont dotés d'une plateforme oncologique pluridisciplinaire pour le suivi des patients ambulatoires sous thérapie antinéoplasique orale : ONCORAL.

Objectif : Evaluer l'impact d'ONCORAL à 1 an en terme d'observance de l'ATCO et de satisfaction du patient pour son traitement

Matériels & Méthodes

Critères d'inclusion dans ONCORAL


- * Tout patient sous ATCO (tout ATCO et tout cancer)
- * Avec des facteurs de risques iatrogènes médicamenteux
 - Caractéristiques patient
 - Fragilités psycho-sociales
 - Pathologie et co-morbidités
 - Traitements
- * A tout moment de sa prise en charge

Critères d'évaluation

Différence mesurée entre EP1 et EP3 sur

- 1/ Observance du patient** en lien avec les pharmaciens d'officine (Questionnaire de Morisky^[1] et taux de renouvellement des ordonnances)
- 2/ Satisfaction du patient pour son traitement** (Echelle SatMedQ^[2])

Parcours ONCORAL d'accompagnement du patient avec entretiens éducatifs personnalisés (EP)



Résultats


Au 31/07/2015 => 226 patients inclus dans ONCORAL, dont 51 ayant eu au moins 3 EP avec la même ligne thérapeutique

22 femmes, 29 hommes **d'âge moyen 66,5 ± 10,7 ans** [36-88]
EP1 et EP3 **espacés en moyenne de 120 ± 75,5 jours**

45% de tumeurs solides et **55%** d'hémopathies malignes
44 ATCO différents


SATISFACTION DU PATIENT AU TRAITEMENT

Echelle SatMed Q à EP1 et EP3



EVALUATION DE L'OBSERVANCE

Proportions de patients en fonction du score de Morisky



- ↗ de l'observance : score de Morisky de 6,7 à 7,2 (p<0,01)
- **Taux de renouvellement moyen de 91%** [42,3-100,0]

Discussion & Conclusion

Ces résultats préliminaires montrent que **le parcours de soins ONCORAL permet d'améliorer l'observance du patient**. Des tendances en faveur d'une diminution de l'impact des effets indésirables sur le quotidien et d'une augmentation de la satisfaction des patients sous ATCO sont à **confirmer sur une plus large population**. De nombreuses études sont en cours, notamment pour évaluer l'impact d'ONCORAL sur la qualité de vie des patients, la prévention des effets indésirables de grades III-IV et des hospitalisations non programmées.