

# EVALUATION DE LA QUALITE DES SOINS ET LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS CANCEREUX A L'INSTITUT SALAH AZAIZ DE TUNIS

SEPO Société française de Pharmacie Oncologique

M. LARIBI<sup>1</sup>, W. RAJHI<sup>1</sup>, A. BEN SAID<sup>1,2</sup>, I. LIMAYEM<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Unité de Préparation Centralisée des Cytostatiques, Service de pharmacie, Institut Salah Azaiz, Tunis, Tunisie.

<sup>2</sup> Faculté de pharmacie Monastir, Tunisie.

C A. 21E

### INTRODUCTION

# Pour un malade cancéreux, la dégradation physique et la souffrance psychique diminuent fortement sa qualité de vie. L'objectif de cette étude est d'évaluer la qualité des soins et la qualité de vie des patients cancéreux à l'Institut Salah Azaiz.

#### **MATERIEL ET METHODES**

Une étude prospective sur deux semaines a été menée au service de médecine de l'Institut Salah Azaiz de Tunis. Les données ont été recueillies auprès de 35 patients (hommes et femmes) ayant des cancers de différents sites et stades sur la base d'un interrogatoire direct

#### **RESULTATS**

#### Caractéristiques de la population d'étude




Figure 1: Répartition de la population Figure 2: Répartition de la population selon l'âge






Figure 3: Répartition de la population selon le type du cancer

Figure 4: Répartition de la population selon le niveau socio économique

#### Qualité de vie

#### Impact de la maladie sur la vie du patient cancéreux






Prise en charge des symptômes liés à la maladie

#### Prise en charge des effets indésirables liés au traitement

Symptômes liés à la maladie	Patients souffrants	Prise en charge	
Douleurs	91%  • Douleurs d'intensité faible: 28.5% • Douleurs d'intensité moyenne: 34% • Douleurs intenses: 28.5%	57%	
Asthénie	54%	Pas de prise en	
Trouble du sommeil	17%	charge	

Effets indésirables liés au traitement	Patients souffrants	Traitement correcteur	
Vomissements	74%	100%	
Douleurs abdominales	62%		
Affections buccales	51%	54% Traitement préventif	
Alopécie	35%	Pas de précaution particulière	
Toxicité auditive	31,5%	3%	
Irritations cutanées	20%	5%	

## Qualité des soins



- Pas de prise en charge psychologique spécialisée.
- Prise en charge par les infirmiers jugée satisfaisante par 80% des patients.
- Degré de gêne lors de l'administration des médicaments jugée acceptable par 65% des patients.

# DISCUSSION ET CONCLUSION

En évaluant la qualité des soins, une absence d'assistance psychologique spécialisée a été constatée ainsi qu'une insuffisance dans la prise en charge des effets indésirables liés à la maladie et au traitement. Ceci mène à réfléchir sur une approche multidisciplinaire qui permettra d'offrir un meilleur suivi médical et psychologique à court et à long terme.